

**УТВЕРЖЕНО**  
**Приказ Министерства**  
**здравоохранения Украины**  
04.04.2018 №614  
**Регистрационное удостоверение**  
№ UA/16643/01/01  
UA/16644/01/01  
UA/16645/01/01

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению лекарственного средства**

**ЛАРИТИЛЕН®**  
**(LARYTYLEN)**

**Состав:**

*действующие вещества:* деквалиния хлорид, дибукаина гидрохлорид;

1 таблетка для рассасывания содержит деквалиния хлорида в пересчете на 100 % вещество 0,25 мг, дибукаина гидрохлорида в пересчете на 100 % вещество 0,03 мг;

*вспомогательные вещества:*

таблетки со вкусом мяты: сорбит (Е 420), тальк, кремния диоксид коллоидный водный, магния стеарат, ароматизатор мята перечная, масло мяты перечной;

таблетки со вкусом мяты и малины: сорбит (Е 420), тальк, кремния диоксид коллоидный водный, магния стеарат, ароматизатор малина, масло мяты перечной;

таблетки со вкусом мяты и лимона: сорбит (Е 420), тальк, кремния диоксид коллоидный водный, магния стеарат, ароматизатор лимон, масло мяты перечной.

**Лекарственная форма.** Таблетки для рассасывания.

*Основные физико-химические свойства:* белые круглые таблетки с фаской с обеих сторон и насечкой с одной стороны.

**Фармакотерапевтическая группа.** Препараты, применяемые при заболеваниях горла.

Код АТХ R02A.

**Фармакологические свойства.**

*Фармакодинамика.*

Как бактерицидное и фунгистатическое вещество деквалиния хлорид влияет на микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Спектр действия этого местного химиотерапевтического вещества широк и включает большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибы, спирохеты и патогенные микроорганизмы, вызывающие смешанные инфекции ротовой полости и горла. Накопление в организме дибукаина гидрохлорида облегчает болевой симптом, сопровождающий инфекции ротовой полости и горла.

Микроорганизмы, устойчивые к действию деквалинию хлорида, неизвестны.

Не вызывает образования кариеса.

*Фармакокинетика.*

Основной активный ингредиент абсорбируется в очень незначительном количестве.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

Местное лечение острых воспалительных заболеваний ротовой полости и горла: гингивит, язвенный и афтозный стоматит, тонзиллит, ларингит и фарингит. Ларитилен® также рекомендуется применять при наличии неприятного запаха изо рта.

Ларитилен® можно применять в случаях смешанной инфекции ротовой полости и горла (по рекомендации врача); как вспомогательный препарат при лечении катаральной ангины, лакунарной ангины и ангины Плаута – Венсана; в случае кандидоза полости рта и глотки.

Рекомендуется в послеоперационный период после тонзиллэктомии и удаления зубов.

### ***Противопоказания.***

Повышенная чувствительность к любому из веществ, входящих в состав препарата. Аллергия на четвертичные аммониевые соединения (например на бензалкония хлорид).

### ***Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.***

Антибактериальная активность деквалиния снижается при одновременном применении с анионными тензидами, например, в составе зубной пасты. Применение препарата не следует сочетать с приемом ингибиторов холинэстеразы.

### ***Особенности применения.***

Поскольку препарат не содержит сахара, он пригоден для применения больным сахарным диабетом.

Препарат содержит сорбит, поэтому его не следует применять пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как синдром непереносимости фруктозы. Применять с осторожностью пациентам с низким уровнем холинэстеразы в плазме крови.

### ***Применение в период беременности и кормления грудью.***

#### ***Беременность***

По имеющемуся данным, контролируемых исследований не проводилось. В этих обстоятельствах препарат в период беременности можно применять после консультации с врачом, если лечебный эффект превышает возможный риск для плода.

#### ***Период кормления грудью***

По имеющемуся данным, не проводились клинические исследования относительно проникновения действующих веществ в грудное молоко. Препарат не рекомендуется применять в период кормления грудью.

### ***Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.***

По имеющемуся данным, исследования относительно влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились. Однако вероятность того, что препарат может иметь какое-либо негативное влияние в этом отношении, очень мала.

### ***Способ применения и дозы.***

#### ***Взрослым и детям старше 12 лет***

Назначают по 1 таблетке каждые 2 часа, после уменьшения симптомов воспаления – по 1 таблетке каждые 4 часа.

#### ***Детям старше 4 лет***

Назначают по 1 таблетке каждые 3 часа, после уменьшения симптомов воспаления – по 1 таблетке каждые 4 часа.

Максимальная суточная доза составляет 10 – 12 таблеток в период острой фазы и 6 таблеток после того, как воспалительные симптомы исчезнут.

Таблетки следует сосать медленно, не разжевывая. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально. Пациент должен проконсультироваться с врачом, если через 5 дней лечения препаратом симптомы не исчезли или ухудшились.

*Дети.* Препарат в данной лекарственной форме не назначают детям младше 4 лет.

***Передозировка.***

В общем препарат хорошо переносится. В случае передозировки возможны тошнота, рвота, в редких случаях – язвы и некроз пищевода.

Лечение передозировки симптоматическое, при необходимости можно применить обволакивающие средства.

Не следует вызывать рвоту и промывать желудок, эти меры не являются целесообразными.

***Побочные реакции.***

Иногда могут наблюдаться реакции гиперчувствительности после применения препарата, например сыпь, зуд, чувство жжение, раздражение слизистой оболочки ротовой полости и горла. В редких случаях, а именно при злоупотреблении, возможно возникновение язвы и некроза. В случае возникновения каких-либо необычных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшей терапии.

***Срок годности.*** 1,5 года.

***Условия хранения.***

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

***Упаковка.***

По 10 таблеток в блистере, по 1 или 2, или 4 блистера в пачке.

***Категория отпуска.*** Без рецепта.

***Производитель.***

ПАО «Киевмедпрепарат».

***Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.***

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

***Дата последнего пересмотра.*** 04.04.2018