

АМОКСИЦИЛІНУ ТРИГІДРАТ (порошок для перорального застосування)

листівка-вкладка

Опис

Порошок білого або майже білого кольору

Склад

1 кг препарату містить діючу речовину:
амоксиклін тригідрат (у перерахуванні на амоксицилін)
- 500,0 г.

Допоміжні речовини: кислота лимонна безводна.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01- антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01CA04 - Амоксицилін.

Амоксицилін є напівсинтетичним представником бета-лактамів, що порушує синтез клітинної стінки бактерій в фазі активного росту та викликає загибель мікроорганізмів. Спектр активності амоксициліну щодо грампозитивних мікроорганізмів включає: *Streptococcus spp.*, *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus spp.* (крім штамів, що продукують бета-лактамази), *Corynebacterium diphtheriae*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*. Препарат активний також відносно грамнегативних мікроорганізмів (*Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Bordetella pertussis*, деяких штамів *Haemophilus influenzae*, *Escherichia coli*, *Shigella spp.*, *Salmonella spp.* і ін.), а також до деяких спірохет (*Leptospira spp.*, *Borrelia spp.*). Амоксицилін руйнується бета-лактамазами. Кислотостійкий.

Амоксицилін добре всмоктується при пероральному прийомі, корм практично не впливає на його біодоступність. Стейкий у кислому середовищі. Препарат створює терапевтичні концентрації у добре васкуляризованих тканинах та рідинах організму. Екскреція амоксициліну відбувається в незміненому вигляді нирками. Концентрація препарату у жовчі, сечі та тканині нирки у десятки разів перевищують сироваткові, що дозволяє виконувати санацію жовчови-

дних та сечовивідних шляхів. Фармакокінетика амоксициліну у ссавців та у птахів має відмінності. Так, розподіл та елімінація амоксициліну у птахів відбувається швидше, ніж у ссавців. Біотрансформація препарату у процесі його елімінації відіграє у птахів важливішу роль, ніж у ссавців. Амоксициліну тригідрат, так само як і інші пеніциліни має низьку токсичність, так як не має мішені дії в еукаріотичній клітині.

Застосування

Кури (окрім несучок, яйця яких призначені у споживання), курчата-бройлери, індички та качки: лікування птиці, хворої на пастерельоз та коліінфекцію (ешерихіоз), що спричинені мікроорганізмами (*E. coli*), які чутливі до амоксициліну.

Телята до 3-х місячного віку: лікування тварин при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксициліну.

Свині: лікування тварин при захворюваннях органів дихання та травного каналу, що спричинені *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Streptococcus suis* та *E. faecalis*, *E. coli*, чутливими до амоксициліну.

Дозування

Перорально.

Курчата-бройлери та кури (окрім несучок, яйця яких призначені у споживання): 15-20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (30-40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою протягом 3-5 діб;

Качки: 20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою протягом 3-5 діб;

Індички: 15-20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (30-40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою протягом 3-5 діб;

Свині: 20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою або кормом протягом 5 діб. Добову дозу препарату рекомендується розділити на два прийоми з інтервалом в 12 годин;
Телята до 3-х місячного віку: 10-20 мг діючої речовини на 1 кг маси тіла (20-40 мг препарату на 1 кг м.т.) на добу з питною водою або кормом протягом 5 діб. Добову дозу препарату рекомендується розділити на два прийоми з інтервалом в 12 годин.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до амоксициліну, а також кролям, хом'якам, мурчакам та іншим дрібним травоядним тваринам.

Не застосовувати тваринам із тяжкими порушеннями нирок.

Не застосовувати курам-несучкам, яйця яких призначені для використання в їжу людям.

Не застосовувати для телят з функціонально нерозвиненими передшлунками.

Застереження

Забій тварин та птиці на м'ясо дозволяють через 10 діб (свині, телята) та 5 діб (свійська птиця) після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

При роботі з ветеринарним препаратом та з водою, в яку додано цей препарат, слід уникати прямого контакту з очима, шкірою та слизовими оболонками та вдягати засоби індивідуального захисту. При випадковому потрапленні у очі промивати водою 15 хвилин. Після роботи з продуктом вимийте руки. Якщо після контакту з препаратом спостерігається алергічна реакція (наприклад, шкірний висип, кропив'янка, ускладненість дихання) слід негайно звернутись до лікаря.

Форма випуску

Поліетиленовий мішок по 1000,0 г. По 1 мішку у пластиковому відрі.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 15 °С до 25 °С.

Термін придатності препарату – 2 роки. Розчин препарату можна зберігати протягом 24 годин за температури від 15 °С до 25 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ПАТ "Київмедпрепарат"

01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139

Виробник готового продукту

ПАТ "Київмедпрепарат"

01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139

RM-PM-IN-02223