

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**02.08.13 № 684**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/8838/01/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**РЕКУТАН®**  
**(RECUTAN)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* квітів ромашки екстракт рідкий (*Chamomilla flores extractum liquidum*)  
(екстрагент 50 % (об/об) етанол) (1:1) - до 100 мл;  
*допоміжні речовини:* полісорбат-80, етанол 50 %.

**Лікарська форма.** Рідина.

Рідина темно-бурого кольору з запахом ромашки. Допускається утворення осаду.

**Назва і місцезнаходження виробника.** ПАТ «Галичфарм».  
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.

**Фармакотерапевтична група.** Дерматологічні препарати.  
Код АТС D11A X.

Рекутан® має низку ефектів, обумовлених хімічними речовинами, що входять до складу екстракту квітів ромашки, зокрема протизапальний (пригнічує ексудативні процеси), ранозагоювальний (стимулює регенерацію тканин), а також чинить певну антисептичну дію. Рекутан® не чинить місцевопоздразнювальної дії. Тривале застосування препарату не спричиняє негативного впливу на організм.

**Показання для застосування.**

Як самостійний засіб або у комплексній терапії при запальних захворюваннях порожнини рота (стоматити, гінгівіти, глосити, пародонтоз) при захворюваннях верхніх дихальних шляхів (фарингіти, тонзиліти, у тому числі після тонзилектомії); у проктології при геморої; у гінекології - місцево при запальних процесах, ерозія шийки матки; для профілактичної обробки піхви перед операцією кесаревого розтину. Препарат застосовують у вигляді полоскань, інгаляцій, клізм, ванночок.

Внутрішньо при хронічному гастриті, коліті, ентероколіті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Належні засоби безпеки при застосуванні.**

Не можна застосовувати нерозведений препарат. При застосуванні препарату слід дотримуватись рекомендованих доз. Пацієнти, які мають в анамнезі підвищену чутливість до родини *Asteraceae/Compositae* (амброзія, хризантеми, календула, маргаритка) більш схильні до розвитку алергічних реакцій при застосуванні препаратів, які містять екстракт ромашки.

**Особливі застереження.****Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат у період вагітності не призначати. У період годування груддю препарат застосовувати тільки за призначенням лікаря.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

При застосуванні внутрішньо слід врахувати, що разова доза препарату містить 5 % етанолу, тому при застосуванні препарату внутрішньо слід утриматися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

**Діти.**

Досвід застосування препарату дітям відсутній.

**Спосіб застосування та дози.**

При захворюваннях порожнини рота - для полоскань: 2 чайні ложки (10 мл) препарату розчиняють у склянці (200 мл) води. При парадонтозі у цьому розчині змочують турунди, котрі вводять у ясневі кишені на 10-15 хвилин щоденно протягом 3-7 днів.

При захворюваннях верхніх дихальних шляхів - для щоденних інгаляцій використовують розчин: 2 чайні ложки (10 мл) препарату розчиняють у склянці (200 мл) води, застосовують протягом 10 днів.

При захворюваннях шлунка та дванадцятипалої кишки (хронічному гастриті, коліті, ентероколіті, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки) екстракт приймають внутрішньо у вигляді розчину: дорослим 1 чайна ложка (5 мл препарату на ½ склянки - (100 мл) теплої води за 20 хвилин до їди 2-4 рази на добу.

При геморої застосовують у вигляді клізм і ванночок: 2 чайні ложки (10 мл) препарату на склянку (200 мл) теплої води 2-3 рази на добу.

Для піхвових промивань - 2-3 столові ложки (30-45 мл) препарату на 1 л теплої води 2-3 рази на добу протягом 3-4 тижнів.

**Передозування.** Даних немає.

**Побічні ефекти.** При індивідуальній підвищеній чутливості до ромашки можливі алергічні реакції (гіперемія, свербіж шкіри, висипання, кропив'янка, набряк Квінке, анафілактичний шок).

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Взаємодія з лікарськими засобами поки що не відома.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 100 мл у флаконах або банках скляних чи флаконах полімерних, вкладених у пачку.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**