

ФОРТАНА 10% розчин для ін'єкцій
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозора рідина рожевого кольору.

Склад

100 мл препарату містить діючі речовини:

Бутафосфан – 10,0 г,

Ціанокобаламін – 0,005 г.

Допоміжні речовини: бутанол, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

ATCvet QA12C — інші мінеральні добавки. QA12CX91 — інші мінеральні продукти, комбінації.

ФОРТАНА 10% розчин для ін'єкцій — стимулятор обміну речовин та тонізуючий засіб. Діючі речовини, що входять до складу препарату, проявляють стимулюючу дію на всі процеси обміну в організмі (білковий, вуглеводневий та жировий), підвищують резистентність організму до впливу несприятливих факторів, сприяють росту і розвитку тварин.

Фосфор, який входить до складу препарату, впливає майже на всі асиміляційні процеси, які відбуваються в організмі. Він міститься в такій формі, яка швидко виділяється з організму. Органічні препарати фосфору, завдяки їх виключно фізіологічному типу дії, є прекрасними загальними метаболічними стимуляторами. Це також підтверджується тим фактом, що побічні ефекти, такі як серцебиття, тремор, підвищене потовиділення і т.п., які часто спостерігаються при застосуванні інших тонізуючих засобів, не спостерігаються. Крім того, здатність до реагування органів з гладкою мускулатурою підвищується.

Препарат в терапевтичних дозах діє, в основному, на скелетну систему, стимулює органи з гладкими м'язами (сечовидільна система, жовчний міхур) та серцевий м'яз. Гострі та хронічні метаболічні розлади добре корегуються препаратом.

Вітамін B12 (ціанокобаламін) стимулює білковий, вуглеводневий та жировий обміни, позитивно впливає на червоні кров'яні тільця, стимулює їх ріст.

У дослідженнях на великій рогатій худобі після одноразового внутрішньовенного введення разової дози 5 мг/кг маси тіла елімінація відбувається відносно швидко з кінцевим періодом напіввиведення 3,2 години. У корів було встановлено, що екскреція з молоком була низькою.

У дослідженнях на собаках після одноразового підшкірного введення разової дози 20 мг/кг маси тіла абсорбція та елімінація бутафосфану відбувається відносно швидко. T_{max} у собак становить 0,75 години, а кінцевий період напіввиведення - приблизно 9 годин.

Застосування

Тонізуючий засіб, який стимулює обмін речовин у великої рогатої худоби, собак, котів та хутрових звірів при:

- порушенні обміну речовин, викликаних поганою годівлею, утриманням або різними захворюваннями;
- порушенні годівлі, розвитку і внаслідок хвороб, при вирощуванні молодняка;
- стимуляції родової діяльності та як допоміжний засіб при гіпокальціємії;
- післяродових захворюваннях (виснаженнях), після важких родів, а також, як допоміжний засіб при лікуванні неплідності;
- тетанічних синдромах і парезі;
- ослабленому стані у тварин;
- вторинній анемії, анеміях при гельмінтозах;

а також для:

- підвищення резистентності організму;
- підвищення м'язової активності здорових тварин.

Дозування

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно.

Великій рогатій худобі препарат вводять внутрішньовенно.

Іншим видам тварин препарат вводять внутрішньовенно, внутрішньом'язово або підшкірно.

Дози (разові, добові) становлять (на тварину, мл):

велика рогата худоба — 10,0-25,0;

телята — 5,0-12,0;

собаки — 0,5-5,0;

коти і хутрові звірі — 0,5-2,5.

За необхідності препарат вводять у тих же дозах щодобово під наглядом та за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини до тих пір доки це необхідно.

При хронічних захворюваннях тваринам вводять половину дози від вказаної вище. При необхідності курс лікування повторюють через 5-14 діб.

Протипоказання

Препарат не призначений для собак та котів із хронічною нирковою недостатністю.

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату.

Застереження

Побічна дія

Не відомо.

Особливі застереження при використанні

Великій рогатій худобі препарат не слід вводити внутрішньом'язово або підшкірно.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Дані відсутні.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відомо.

Період виведення (каренції)

Відсутній.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Первинна упаковка: флакон з темного скла з номінальним об'ємом 100 мл, пробка гумова, ковпачок з білою пластиковою накладкою.

Зберігання

Зберігати препарат у недоступних для дітей місцях, окремо від кормів та продуктів харчування за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності препарату – 2 роки.

Термін придатності після відкриття флакону – не більше 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», м. Київ, вул. Саксаганського, 139, 01032, Україна.

Виробник готового продукту

ПАТ «Галичфарм», м. Львів, вул. Опришківська, 6/8, 79024, Україна.