





















Порушення з боку серця			аритмія (таксікардія)		
Судинні розлади		артеріальна гіпертензія, флебіт, тромбофлебіт	транзисторна ішемічна атака		
Шлунково-кишкові розлади	діарея, нудота, блювання	локальний або загальний біль у животі, запор, сухість у роті, диспепсія, гастрит, глюсит, послаблення випорожнення, панкреатит, стоматит, розлади або зміна кольору язика			знебарвлення поверхні зубів
Розлади гепатобіліарної системи	аномальні функціональні печінкові проби, збільшення рівнів АЛТ, АСТ або лужної фосфатази	підвищення загального білірубіну			
Зміни з боку шкіри та підшкірної клітковини		дерматит, надмірне потовиділення, свербіж, висип, крапив'янка			бульозні ураження шкіри, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, ангіоедема, алопеція
Розлади з боку нирок і сечовидільної системи	підвищення азоту сечовини крові	поліурія, підвищення креатиніну	ниркова недостатність		
Розлади репродуктивної системи та молочних залоз		вульвовагінальні порушення			
Загальні розлади та порушення в місці введення		втома, гарячка, біль у місці ін'єкції, спрага, локалізований біль			
Дослідження	Біохімія: підвищення ЛДГ, креатинінкінази, ліпази, амілази	Біохімія: підвищення натрію або кальцію; зниження			

